

# Körperkondition und Häufigkeit von Ovarialzysten bei Braunviehkühen während der ersten 40 Laktationstage\*

M. Hasler<sup>1</sup>, U. Eigenmann<sup>1</sup>, F. Janett<sup>2</sup>, R. Thun<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Praxis Dr. U. Eigenmann, Degersheim, <sup>2</sup>Klinik für Fortpflanzungsmedizin der Universität Zürich

## Zusammenfassung

Die Untersuchung wurde an 50 Milchviehkühen der Rasse Braunvieh in 21 Betrieben durchgeführt. 25 peripartal überkonditionierten Kühen (Rückenfettdicke > 38 mm) wurden 25 peripartal nicht überkonditionierte Tiere (Rückenfettdicke ≤ 38 mm) zugeordnet. An den Tagen 20, 30 und 40 post partum wurden die Ovarien mittels Ultraschall untersucht und 10, 15, 20, 30 und 40 Tage nach der Abkalbung die Konzentrationen von Progesteron und 17β-Oestradiol im Plasma bestimmt. Bei den peripartal überkonditionierten Tieren wurden 12, bei den nicht überkonditionierten lediglich 1 Ovarialzyste festgestellt (P < 0.05). Bei der ersten Untersuchung wurden alle Ovarialzysten sonografisch als Follikelthekazysten (Plasmaprogesteron ≤ 0.5 ng/ml) beurteilt. Im weiteren Untersuchungsverlauf persistierten 3 als Thekazysten, bei 8 Zysten trat eine Luteinisierung ein und 2 Zysten heilten ab. Es gab keinerlei Hinweise, dass überkonditionierte Kühe infolge des höheren Fettansatzes vor dem Auftreten der Ovarialzysten höhere Progesteron- und/oder Östrogenwerte im Plasma aufwiesen.

**Schlüsselwörter:** Kuh, Körperkondition, Ovarialzysten, Oestradiol, Progesteron

## Body condition and frequency of ovarian cysts in Brown Swiss cows during the first 40 days of lactation

For this investigation 50 Brown Swiss cows from 21 different farms were used. Twentyfive peripartal overconditioned cows (back fat thickness > 38 mm) were compared with 25 peripartal not overconditioned animals (back fat thickness < 38 mm). On days 20, 30 and 40 post partum the ovaries were examined sonographically and 10, 15, 20, 30 and 40 days after calving plasma concentrations of progesterone and 17-β estradiol were determined. In peripartal overconditioned animals 12 ovarian cysts were found while only one cyst was present in not overconditioned cows (P < 0.05). At first examination all ovarian cysts were classified by ultrasound as follicle theca cysts (progesterone < 0.5 ng/ml plasma). Follow examinations resulted in 3 cysts which persisted as theca cysts while 8 cysts became luteinized and 2 cysts completely regressed. There was no indication of increased plasma progesterone and/or estradiol concentrations in overconditioned cows with higher fat deposit before of ovarian cysts had occurred.

**Key words:** cow, body condition, ultrasound, ovarian cysts, estradiol, progesterone

## Einleitung

Energiedepots in Form von Körperfett spielen im Fruchtbarkeitsgeschehen der Milchkuh eine entscheidende Rolle. Peripartal fette Tiere zeigen vermehrt Ovarialzysten und Fertilitätsprobleme (Gearhart et al., 1990; Mösenfechtel et al., 2000). Warum bei überkonditionierten Kühen zu Beginn der Laktation Ovarialzysten häufiger auftreten und um welche Zystenart es sich handelt, ist unklar. Im veterinärmedizinischen Schrifttum gibt es Hinweise, dass bei

einem Energiedefizit das im Fett gespeicherte Progesteron infolge Lipolyse vermehrt freigesetzt wird und zu geringgradig erhöhten Blutkonzentrationen führen kann, die ihrerseits stille Brunst (Schopper und Claus, 1986) und die Bildung von Ovarialzysten (Noble et al., 2000; Silvia et al., 2002) auslösen können. Zudem ist aus der Humanmedizin bekannt, dass bei der Frau die Oestrogenkonzentration im Blut eng mit dem Fettanteil im Organismus korreliert ist, da die im Fettgewebe vorkommende Aromatase Androgene in Östrogene umzuwandeln vermag

\*Dissertation M. Hasler, 2003

(Frisch, 1988; Frisch et al., 1992). Wäre dies auch bei überkonditionierten Kühen der Fall, könnten erhöhte Östrogenkonzentrationen im Blut ebenfalls ein Grund für das vermehrte Auftreten von Ovarialzysten sein (Wiltbank et al., 2002). Da noch keine hormonanalytischen Untersuchungen von überkonditionierten Kühen bereits vor dem Auftreten von Ovarialzysten vorliegen, bestand das Ziel der vorliegenden Arbeit darin, a) die Inzidenz und Art von Ovarialzysten bei peripartal über- und nicht überkonditionierten Kühen während der ersten 40 Laktationstage zu bestimmen und b) den Verlauf von Oestrogen und Progesteron vor und nach dem Auftreten von Ovarialzysten zu verfolgen.

## Tiere, Material und Methoden

### Tiere

Die Untersuchungen wurden an 50 klinisch gesunden Milchviehkühen der Rasse Braunvieh mit unterschiedlichem Brown-Swiss-Einkreuzungsgrad durchgeführt. Kühe mit einer Zwillingsfruchtbarkeit, einer Schweregeburt oder einer Retentio secundinarum wurden vom Versuch ausgeschlossen.

### Versuchsbetriebe und Versuchszeitraum

Die Untersuchungen wurden in 21 auf 650 bis 1000 m über Meer liegenden Milchviehbetrieben im Untertoggenburg (Kanton St. Gallen) und in angrenzenden Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden durchgeführt und dauerten von Oktober 2002 bis März 2003. Sämtliche Tiere wurden in Anbindehaltung gehalten.

### Fütterung

Die von Graswirtschaft und Rohmilchkäseproduktion geprägte Region bestimmte auch weitgehend die Art der Fütterung. Unabhängig vom Laktationsstadium erhielten die Tiere als Grundfutter Heu ad libitum und ca. 50g Viehsalz. Zwei Wochen vor der Abkalbung erhielten die Kühe in zunehmenden Mengen Kraftfutter, bis sie zum Zeitpunkt des Partus 1 bis 2 kg eines ausgeglichenen Milchviehfutters aufnahmen. Während der ersten 3 Monate post partum bekamen die Tiere ca. 100g einer Mineralsalzmischung (Calcium-Phosphor Verhältnis 2:1). Ab einer Milchleistung von 18 kg/Tag wurden pro 2 kg Mehrleistung an Milch zusätzlich 0.3 bis 1 kg eines ausgeglichenen Milchviehfutters vorgelegt.

### Versuchsplanung

In Abbildung 1 ist die Versuchsplanung mit Zeitangaben der erhobenen Parameter aufgezeichnet.




Abbildung 1: Versuchsplanung mit Zeitangaben für die Rückenfettdickenmessung (RFD), Blutentnahmen und Ovaruntersuchung.

Mittels Ultraschallmessung der Rückenfettdicke wurden in 21 Milchviehbetrieben 25 peripartal überkonditionierte Braunviehkühe ermittelt. Jeder überkonditionierten Kuh wurde aus dem gleichen Betrieb ein peripartal nicht überkonditioniertes Tier zugeordnet und 40 Tage nach der Abkalbung bei allen Tieren nochmals die Rückenfettdicke bestimmt. Bei sämtlichen 50 in den Versuch aufgenommenen Kühen wurden zusätzlich folgende Daten erhoben: An den Tagen 20, 30 und 40 post partum wurden Ultraschalluntersuchungen der Ovarien durchgeführt und an den Tagen 10, 15, 20, 30 und 40 nach der Abkalbung erfolgten Blutentnahmen zur Bestimmung der Progesteron- und  $17\beta$ -Oestradiol-Konzentrationen.

### Milchleistung und Laktationsnummer

Die energiekorrigierte 100-Tage-Milchleistung der peripartal über- und nicht überkonditionierten Tiere betrug im Mittel  $2660 \pm 144$  kg bzw.  $2830 \pm 142$  kg ( $P > 0.05$ ). Von allen über- und nicht überkonditionierten Kühen waren 4 bzw. 2 Erstkalbinnen, die übrigen standen in der 2. oder einer der folgenden Laktationen.

### Erkrankungen

Während der ganzen Versuchsdauer erlitten insgesamt 8 Kühe eine Allgemeinerkrankung: 5 peripartal überkonditionierte und 2 zum gleichen Zeitpunkt nicht überkonditionierte Tiere litten an Gebärgparese und eine peripartal überkonditionierte Kuh entwickelte eine primäre Ketose. Sämtliche Tiere sprachen auf eine übliche Standardbehandlung an. Daneben zeigten 5 bzw. 4 peripartal über- und nicht überkonditionierte Tiere 10 Tage post partum leicht übelriechenden Vaginalausfluss. Diese Kühe wurden intrauterin mit 4 Injecur-Uterus-Stäben (1000 mg Tetracyclini hydrochloricum, 500 mg Clioquinolum, Veterinaria AG, Zürich) behandelt.

### Messung der Rückenfettdicke (RFD) und Konditionsbeurteilung

Die Rückenfettdickenmessung erfolgte mittels Ultraschall nach der Methode von Staufenbiel (1997). Sämtliche RFD-Werte wurden in mm angegeben und beinhalten neben der Fettdicke auch die Hautdicke. Die Konditionsbeurteilung sämtlicher Versuchstiere erfolgte nach den Angaben von Mösenfechtel et al. (2000) und ist in Tabelle 1 zusammengefasst. Bei jedem Tier wurde die Rückenfettdicke 10–20 Tage vor und 10 Tage nach dem Kalben errechnet. Der so ermittelte Durchschnittswert wurde peripartale RFD genannt. Betrug dieser Wert >38 oder ≤ 38 mm wurden die Kühe als peripartal über- bzw. nicht überkonditioniert eingestuft. Die 40 Tage post partum ermittelte RFD wurde als postpuerperale RFD bzw. Körperkondition bezeichnet.

### Gynäkologische Untersuchung

Bei allen Tieren wurde am 20., 30. und 40. Laktationstag mittels Ultraschall eine Ovaruntersuchung durchgeführt. Hierzu wurde ein portables Ultraschallgerät (Scanner 100Vet, Pie Medical Equipment B.V., Maastricht, Niederlande) mit einem 5/7.5 MHz-Linear-Array-Schallkopf verwendet. Die Diagnose «Ovarialzyste» wurde dann gestellt, wenn auf wenigstens einem Ovar eine Blase mit einem Innendurchmesser von mehr als 25 mm in Grösse und Lokalisation während 10 Tagen bei gleichzeitiger Abwesenheit eines Corpus luteum persistierte. Die Unterteilung der Ovarialzysten in Follikeltheka- und Follikellutein-Zysten erfolgte aufgrund der Beschaffenheit der Zystenwand und des Zystenhohlraumes: Dünnwandige echofreie Blasen wurden als Follikeltheka-, Blasen mit wenig echogebender Wand und/oder mässig echogenem Inhalt als Follikellutein-Zyste beurteilt (Farin et al., 1990). Wurde auf den Ovarien zu irgendeinem Untersuchungszeitpunkt ein Corpus luteum festgestellt, wurde die Kuh als zyklisch bewertet (Wiltbank et al., 2002). Ging dem Corpus luteum eine Ovarialzyste voraus, wurde diese als abgeheilt beurteilt (Silvia et al., 2002). Waren zu allen Untersuchungszeitpunkten nur Follikel mit Innendurchmesser < 20 mm und kein C. luteum sichtbar, galt das Versuchstier als anovulatorisch (Lucy et al., 1992; Wiltbank et al., 2002).

Tabelle 1: Konditionsbeurteilung aufgrund der peripartalen und postpuerperalen Rückenfettdicke (RFD).

peripartale RFD	postpuerperale RFD	Beurteilung
29–33 mm	< 28 mm	unterkonditioniert
34–38 mm	28–34 mm	optimal
> 38 mm	> 34 mm	überkonditioniert

### Hormonbestimmung

Die Blutentnahme erfolgte aus der Vena epigastrica caudalis in heparinisierte Blutröhrchen. Die Blutproben wurden anschliessend bei 3000 U/min während 5 Minuten zentrifugiert und das gewonnene Plasma bei -25°C gefroren. Die Bestimmung von Progesteron (Progesterone # 2465 04 bovine Radioimmunoassay kit, Immunotech, Marseille) und Östradiol-17β (Estradiol, # 2464 bovine Radioimmunoassay kit, Immunotech, Marseille) erfolgte am Institut für Physiologie, Technische Universität München. Die Empfindlichkeit für Progesteron und Östradiol-17β betrug 0.1 ng/ml (Prakash et al., 1987) bzw. 0.8 pg/ml (Meyer et al., 1990).

### Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung erfolgte nach Weber (1995). In sämtlichen Abbildungen wurden Mittelwert und Standardfehler dargestellt, bei Häufigkeitsverteilungen gelangte die absolute Anzahl zur Auswertung. Bei Mittelwertvergleichen nicht normalverteilter Stichproben wurde der U-Test nach Mann und Whitney durchgeführt. Häufigkeitsverteilungen wurden mit der Zwei-mal-k-Tafel auf signifikante Unterschiede geprüft. Zwischen der peripartalen und postpuerperalen RFD wurde der Korrelationskoeffizient berechnet. Den statistischen Auswertungen wurde eine Irrtumswahrscheinlichkeit von P < 0.05 zugrunde gelegt.

### Ergebnisse

#### Beziehung zwischen peripartaler und postpuerperaler RFD

Der Korrelationskoeffizient zwischen der Rückenfettdicke beim Abkalben und derjenigen 40 Tage p.p. war signifikant und betrug 0.88. Von den 25 peripartal überkonditionierten Tieren waren 40 Tage nach der Abkalbung immer noch 18 überkonditioniert (Abb. 2) und nur 7 Kühe optimal konditioniert. Die peripartal




Abbildung 2: Peripartale und postpuerperale (40 Tage post partum) Körperkondition bei den Versuchstieren.

Tabelle 2: Häufigkeit und Schicksal von Ovarialzysten während der ersten 40 Laktationstage.

Versuchstiere (n = 50)	Ovarialzysten		
	total	Persistenz	Rückbildung
peripartal überkonditioniert (n = 25)	12 <sup>a</sup>	10 <sup>a</sup>	2
peripartal nicht überkonditioniert (n = 25)	1 <sup>b</sup>	1 <sup>b</sup>	0

<sup>a,b</sup> Werte mit unterschiedlichen Indizes sind signifikant verschieden (P < 0.05)

nicht überkonditionierte Gruppe (n=25) setzte sich aus 9 optimal und 16 unterkonditionierten Kühen zusammen. Von den 9 optimal konditionierten Tieren wiesen 8 auch postpuerperal eine optimale Körperkondition auf und lediglich 1 Kuh war postpuerperal unterkonditioniert. Von den 16 peripartal unterkonditionierten Tieren wiesen 13 auch postpuerperal einen zu geringen Fettansatz auf und nur 3 Tiere schafften den Sprung in den postpuerperal optimal konditionierten Zustand.

### Vorkommen und Charakterisierung von Ovarialzysten

Die peripartal überkonditionierte Gruppe wies während der ersten 40 Laktationstage 12 und damit signifikant mehr Ovarialzysten auf als die zum gleichen Zeitpunkt nicht überkonditionierten Tiere mit lediglich einer Ovarialzyste (Tab. 2).

Elf der 13 Ovarialzysten wurden erstmals 20 Tage p.p., die übrigen 2 Zysten erst 10 Tage später beobachtet. Bei der ersten Untersuchung konnten alle Ovarialzysten sonografisch als Follikelthekazysten eingestuft werden. Im weiteren Verlauf blieben von den insgesamt 13 Thekazysten 3 bis zum 40. Tag p.p. weiterhin als Follikelthekazysten bestehen (Plasmaprogesteronwerte ≤ 0.5 ng/ml). Bei 2 Tieren mit




Abbildung 3: Rechtes Ovar mit a) Follikelthekazyste (Ø 35 mm) 30 Tage p.p. und b) Luteinzyste (Ø 33 mm) 10 Tage später.

Tabelle 3: Einsetzen des Ovarzyklus während der ersten 40 Laktationstage. Zwischen überkonditionierten und nicht überkonditionierten Tieren bestehen keine signifikanten (P < 0.05) Unterschiede.

Versuchstiere (n = 50)	Einsetzen des Ovarzyklus		
	total	ohne voraus- gegangene Zyklusstörung	mit Ovarial- zyste
peripartal überkonditioniert (n = 25)	14	12	2
peripartal nicht überkonditioniert (n = 25)	11	11	0

Follikelthekazysten hatte der Zystendurchmesser bis zum 40. Tag p.p. abgenommen, während sich auf dem anderen Ovar ein Corpus luteum (Plasmaprogesteron 2.5 und 4.3 ng/ml) gebildet hatte und die Zyste somit als funktionell abgeheilt betrachtet wurde. Bei den restlichen 8 Tieren mit Follikelthekazysten konnte spätestens am 40. Tag p.p. eine Luteinisierung der Zyste (mässig echogene Wand und/oder echogener Inhalt im Zystenlumen) beobachtet werden. Die Plasmaprogesteronwerte schwankten zwischen 0.6 und 10.2 ng/ml mit einem Durchschnittswert von 2.9 ng/ml am 40. Tag p.p. In Abbildung 3 ist die Umwandlung einer Follikelthekazyste in eine Follikelluteinzyste dargestellt.

### Einsetzen des Ovarzyklus

Bei den peripartal über- und nicht überkonditionierten Tieren setzte während der ersten 40 Laktations-

Tabelle 4: Nichteinsetzen des Ovarzyklus während der ersten 40 Laktationstage.

Versuchstiere (n = 50)	Nichteinsetzen des Ovarzyklus (Azyklie)		
	total	persis- tierende Ovarialzyste	anovula- torische Follikel
peripartal überkonditioniert (n = 25)	11	10 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>
peripartal nicht überkonditioniert (n = 25)	14	1 <sup>b</sup>	13 <sup>b</sup>
optimal konditioniert (n = 9)	2 <sup>x</sup>	0	2 <sup>x</sup>
unterkonditioniert (n = 16)	12 <sup>y</sup>	1	11 <sup>y</sup>

<sup>a,b</sup> Werte mit unterschiedlichen Indizes sind signifikant verschieden (P < 0.05)

<sup>x,y</sup> Werte mit unterschiedlichen Indizes sind signifikant verschieden (P < 0.05)

tage bei insgesamt 14 bzw. 11 Tieren ein Zyklus ein (Tab. 3), was auch sonografisch (deutlich sichtbares Corpus luteum) erhärtet werden konnte. Die Plasmaprogesteronwerte der Tiere mit deutlich erkennbarem Corpus luteum schwankten zwischen 1.1 bis 15.3 ng/ml. Bei 2 peripartal überkonditionierten Kühen ging dem Einsetzen des Ovarzyklus eine Follikelthekazyste voran. Elf bzw. 14 über- und nicht überkonditionierte Tiere (Tab. 4) blieben während der ersten 40 Laktationstage azyklisch. Bei den peripartal überkonditionierten Kühen ohne Zyklus lag in 10 Fällen eine persistierende Ovarialzyste und in einem Fall eine Azyklie, gekennzeichnet durch anovulatorische Follikel, vor. Bei den 14 peripartal nicht überkonditionierten Kühen ohne Zyklus während der ersten 40 Laktationstage lag in einem Fall eine persistierende Ovarialzyste vor, in allen anderen Fällen waren zu den Untersuchungszeitpunkten 20, 30 und 40 Tage p.p. auf mindestens einem Ovar immer anovulatorische Follikel (Durchmesser 12–18 mm) vorhanden; Corpora lutea fehlten und die Plasmalogesteronwerte lagen unterhalb der Nachweisgrenze. In Tabelle 4 wurden die peripartal nicht überkonditionierten Tiere in eine optimal (n = 9) und eine unterkonditionierte Gruppe (n = 16) unterteilt: Bei den 9 optimal konditionierten Tieren lag in 2 Fällen eine Azyklie (anovulatorische Follikel) vor, während dies bei den 16 unterkonditionierten Kühen 11mal auftrat (P < 0.05). Zusätzlich lag bei einer peripartal unterkonditionierten Kuh eine durch eine Ovarialzyste bedingte Azyklie vor.

**Hormonverlauf**

In den Abbildungen 4 und 5 sind die Oestradiol- und Progesteron-Konzentrationen im Plasma bei den peripartal überkonditionierten Kühen mit und ohne Ovarialzysten sowie bei den nicht überkonditionierten Tieren ohne Ovarialzysten dargestellt. Da nur ein




Abbildung 4: Östradiol-17β-Konzentrationen im Plasma bei überkonditionierten Kühen ohne (■ n = 13) und mit (▒ n = 12) Ovarialzysten sowie bei nicht überkonditionierten Kühen ohne (□ n = 24) Ovarialzysten nach der Abkalbung.

<sup>a,b</sup> Werte mit unterschiedlichen Indizes unterscheiden sich signifikant (P < 0.05)




Abbildung 5: Progesteronkonzentrationen im Plasma bei überkonditionierten Kühen ohne (■ n = 13) und mit (▒ n = 12) Ovarialzysten sowie bei nicht überkonditionierten Kühen ohne (□ n = 24) Ovarialzysten nach der Abkalbung.

<sup>a,b</sup> Werte mit unterschiedlichen Indizes unterscheiden sich signifikant (P < 0.05)

Tier der peripartal nicht überkonditionierten Gruppe eine Ovarialzyste aufwies, wurden die Hormonwerte dieses Tieres in den Abbildungen 4 und 5 nicht berücksichtigt. Die mittleren Plasma-Oestradiolkonzentrationen (Abb. 4) waren bei den überkonditionierten Kühen mit Ovarialzysten 15 und 20 Tage p.p. signifikant höher (10.0 bzw. 12.2 pg/ml) als bei den überkonditionierten Kühen ohne Zysten (4.7 bzw. 4.1 pg/ml) sowie den nicht überkonditionierten Tieren ohne Zysten (3.6 bzw. 4.2 pg/ml). Die durchschnittlichen Progesteronkonzentrationen im Blut (Abb. 5) waren bei den überkonditionierten Tieren ohne Zysten an sämtlichen Messzeitpunkten höher als bei den überkonditionierten Kühen mit Ovarialzysten und den nicht überkonditionierten Kühen ohne Ovarialzysten. Die Mittelwerte der 3 Gruppen waren jedoch zu keinem Zeitpunkt signifikant verschieden.

**Diskussion**

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen haben deutlich gezeigt, dass die peripartale Körperkondition einen bedeutenden Einfluss auf die Kondition 6 Wochen nach der Abkalbung hat. Diesen Zusammenhang haben auch Mösenfechtel et al. (2000) beschrieben, die zwischen der peripartalen und postpuerperalen Rückenfettdicke eine grosse Abhängigkeit (Korrelationskoeffizient 0.8) nachweisen konnten. Dies bedeutet, dass es für eine Kuh schwierig ist, während der Rastzeit die bei der Abkalbung vorhandene Körperkondition zu verbessern. Daraus kann gefolgert werden, dass die optimale Körperkondition bereits zum Abkalbezeitpunkt vorhanden sein muss, damit in der Startphase bei leistungsbezogener Fütterung der Ovarzyklus in Gang kommt. Weiter haben unsere Untersuchungen deutlich erkennen lassen, dass

peripartal überkonditionierte Kühe wesentlich häufiger an Ovarialzysten erkranken als peripartal nicht überkonditionierte Tiere. Diese Beobachtung stellten auch Gearhart et al. (1990), Morrow et al. (1997) sowie Mösenfechtel et al. (2000) fest. Bei der ersten Untersuchung wurden alle Ovarialzysten sowohl sonografisch als auch aufgrund der tiefen Plasma-progesteronwerte als Follikelthekazysten eingestuft. Aufgrund der sonografischen Untersuchungen kann davon ausgegangen werden, dass die zwischen 20 und 30 Tagen p.p. beobachteten Ovarialzysten anfänglich Follikelthekazysten sind. Bislang gibt es unseres Wissens keine Untersuchungen, die zu diesem Zeitpunkt nur Follikelthekazysten nachweisen konnten. Allerdings vermuten auch Garverick (1997) sowie Lopez-Gatius und Lopez-Bejar (2002), dass Luteinzysten ursprünglich Follikelthekazysten waren. Dies würde auch erklären, warum in der Literatur das Verhältnis von Follikeltheka- zu Follikelluteinzysten sehr unterschiedlich angegeben wird. So waren im Patientengut von Leidl et al. (1979) weniger als 10% der Ovarialzysten Luteinzysten, während im Untersuchungsgut von Farin et al. (1990) und Ribadu et al. (1994) über 60% der Zysten luteinisiert waren. Die bei unseren Versuchstieren ursprünglich vorhandenen Thekazysten luteinisierten, persistierten oder bildeten sich durch Ingangkommen eines Ovarialzyklus mit anschließender Lutealphase zurück. Dass Follikelthekazysten während längerer Zeit persistieren und so das Zyklusgeschehen blockieren können, wurde schon früher beschrieben (Garverick, 1997). Auch die Rückbildung von Ovarialzysten durch Ovulation eines heranreifenden parazyklischen Tertiärfollikels ist in erst kürzlich erschienenen Arbeiten (Grunert, 1999; Lopez-Gatius et al., 2002; Wiltbank et al., 2002) dokumentiert. Dabei kann die «Selbstheilungsrate» von Eierstocksysten ganz unterschiedlich ausfallen. In Untersuchungen von Lopez-Gatius et al. (2002) mit über 100 an Zysten erkrankten Kühen bildeten sich die Ovarialzysten bei knapp 40% der Tiere ohne Behandlung zurück. Eine zunehmende Luteinisierung der Follikelthekazysten hingegen, wie wir dies bei 8 von 13 Zysten beobachtet haben, wird in der Literatur (Kesler et al., 1980; Mujuni et al., 1993) nur selten erwähnt. Die Luteinzellen der Zysten lassen sich licht- und elektronenmikroskopisch nicht von denen periodischer Gelbkörper unterscheiden (Gasse et al., 1984; Peukert-Adam et al., 1983) und die Progesteronsekretion von Luteinzysten entspricht bei ausgeprägter Luteinisierung derjenigen von Corpora lutea periodica (Günzler et al., 1977; Leidl et al., 1979; Jeffcoate und Ayliffe, 1995). Aus diesem Grunde betrachten Gasse et al. (1984) sowie Grunert und Zerbe (1997) Luteinzysten als Ausdruck einer vorübergehenden Ovulationsstörung, nicht aber als ein das Zyklusgeschehen des Tieres nachhaltig beeinträchtigendes Gebilde. Träfe diese Aussage zu, würde in

unserem Untersuchungsgut ein grosser Teil der Follikelthekazysten (8 von 13) durch die Umwandlung in eine Luteinzyste zur Abheilung gebracht. Ob diese «Selbstheilung» allerdings auch bei Zysten mit partieller Luteinisierung und niedrigen Progesteronwerten im Blut eintritt, darf bezweifelt werden (Grunert, 1999). So stellten Silvia et al. (2002) bei «Zystentieren» mit tiefen Blut-Progesteronwerten von 0.1 bis 0.9 ng/ml fest, dass die bestehenden Ovarialzysten in 76% der Fälle durch neue Zysten ersetzt wurden. Daher wäre es sinnvoll, in weiteren Arbeiten das Schicksal von Luteinzysten ohne jegliche Behandlungsmassnahme über einen längeren Zeitraum zu verfolgen.

Während der ersten 40 Laktationstage setzte der Ovarzyklus bei den über- und nicht überkonditionierten Kühen etwa gleich häufig ein. Der Grund für das Nichteinsetzen des Zyklus waren bei den peripartal überkonditionierten Kühen hauptsächlich persistierende Ovarialzysten, bei den peripartal nicht überkonditionierten Tieren lag die Ursache vorwiegend in einem Ausbleiben der Ovulation dominanter Follikel. Derartige anovulatorische Zustände sind bei Kühen nach der Abkalbung verschiedentlich beschrieben (Lucy et al., 1992; Wiltbank et al., 2002). In unserer Untersuchung waren derart azyklische Kühe vor allem solche, die bereits peripartal unterkonditioniert waren. Dies weist darauf hin, dass eine Kuh für das Ingangkommen einer normalen Zyklusaktivität nach dem Partus eine minimale Körperkondition, d.h. einen minimalen Körperfettanteil braucht (Bishop et al., 1994; Bossis et al., 2000; Imakawa et al., 1986; Mösenfechtel et al., 2000; Richards et al., 1989). Zum Beispiel setzte der Ovarzyklus bei Mutterkühen mit schlechter Körperkondition bei der Abkalbung später ein als bei Kühen mit mässiger Kondition (Bishop et al., 1994). Moreira et al. (2000) konnten zeigen, dass ein Synchronisationsprogramm bei Tieren mit einem Körperkonditionsindex von <2.5 (5-Punkte-Skala) weit weniger Erfolg hatte, als bei Tieren mit einem höheren Index. In der Arbeit von Mösenfechtel et al. (2000) zeigten 56% der postpuerperal unterkonditionierten Kühe bis zum 65. Tag nach der Abkalbung keinen Oestrus, während postpuerperal optimal konditionierte Tiere in nur 19% der Fälle anöstrisch blieben. Nach Studer (1998) sind bei Kühen mit einem Körperkonditionsindex von 2 und weniger 60 Tage post partum während langen Perioden keine Funktionsstadien auf den Ovarien vorhanden. Dieses Ergebnis zeigt, dass bei Unterschreiten eines bestimmten Körperfettanteils die Zyklusaktivität sistieren kann. Ähnliche Verhältnisse kennen wir auch aus der Humanmedizin, wo insbesondere Langstreckenläuferinnen amenorrhöisch werden, sobald ein Mindestanteil an Fettgewebe unterschritten wird (Frisch et al., 1992).

Die hormonanalytischen Untersuchungen liefern keinerlei Hinweise, dass überkonditionierte Kühe als Folge eines vermehrten Fettabbaus vor der Zystenbildung erhöhte Progesteronkonzentrationen im Plasma aufweisen. Die leicht erhöhten Progesteronwerte der überkonditionierten Kühe ohne Ovarialzysten sind auf die Anwesenheit eines Gelbkörpers bei 9 Tieren am 20. Tag p.p. und bei 8 Tieren am 30. Tag p.p. zurückzuführen. Damit scheint die Hypothese von Schopper und Claus (1986), Progesteron würde bei fetten Kühen infolge einer gesteigerten Lipolyse in grösseren Mengen freigesetzt und sei möglicherweise Ursache für gehäuft auftretende stille Brunsten, unwahrscheinlich. Auch die Östrogenwerte der über- und nicht überkonditionierten Kühe ohne Zysten sind ähnlich, was bei der fetten Kuh mit grosser Wahrscheinlichkeit auf einen anderen Mechanismus schliessen lässt als bei der obesen Frau, bei der die im peripheren Fettgewebe aus Androgenen produzierten Oestrogene mehr als ein Drittel der gesamten Oestrogenproduktion ausmachen (Frisch, 1988; Frisch et al., 1992). Daraus kann gefolgert werden, dass die bei den überkonditionierten Kühen mit Zysten wesentlich erhöhten Östrogenmengen im Blut von Follikel-

thekazysten mit noch intakter Granulosazellschicht stammen (Silvia et al., 2002). Die Ursache von vermehrt auftretenden Ovarialzysten bei überkonditionierten Kühen bleibt weiterhin unbekannt. Inwieweit das im Fettgewebe produzierte Leptin, das die ovarielle Steroidsynthese hemmen soll (Barb et al., 1999), für die Entstehung von Ovarialzysten eine Rolle spielt, bleibt weiterhin abzuklären.

Die vorliegenden Untersuchungen haben gezeigt, dass die Eierstocksfunction bei der puerperalen Kuh wesentlich von der Körperkondition, d. h. vom Körperfettanteil abhängig ist. Ist der Fettanteil zu hoch oder zu niedrig, treten Störungen der Ovarfunktion in Form von Follikelthekazysten bzw. anovulatorischen Zyklen auf.

### Dank

Für die Bestimmungen von Progesteron und Oestradiol möchten wir Prof. Dr. D. Schams, Institut für Physiologie, Technische Universität München, Freising-Weihenstephan, bestens danken.

#### Condition physique et fréquence des kystes ovariens chez des vaches de race brune durant les 40 premiers jours de lactation

La recherche a été effectuée sur 50 vaches laitières de race brune dans 21 exploitations. 25 vaches trop grasses (épaisseur de la graisse dorsale > 38 mm) ont été comparées à 25 vaches en condition normale (épaisseur de la graisse dorsale ≤ 38 mm). Les ovaires ont été examinés par échographies 20, 30 et 40 jours post-partum et la concentration de progestérone et de 17β-oestradiol a été mesurée 10, 15, 20, 30 et 40 jours après la mise bas. Chez les animaux trop gras au moment de la mise bas, 12 kystes ovariens ont été constatés, alors qu'il y en avait un seul chez les animaux de condition normale ( $P < 0.05$ ). Lors du premier examen, tous les kystes ovariens ont été considérés à l'échographie comme des kystes folliculaires. Par la suite 3 d'entre eux ont persistés comme kystes folliculaires, 8 d'entre eux ont lutéinisé et 2 ont guéri. Il n'y avait pas d'indice que les vaches trop grasses aient présenté, avant l'apparition des kystes ovariens, des taux de progestérones ou d'oestrogènes plus élevés en conséquence de leur adiposité.

#### Condizioni del corpo e frequenza delle cisti ovariche durante i primi 40 giorni di lattazione nelle mucche di razza bruna

L'analisi è stata effettuata su 50 mucche da latte di razza bruna in 21 aziende. 25 mucche peripartali con elevato condizionamento (spessore di grasso sulla schiena > 38 mm) sono state associate a 25 animali peripartali senza elevato condizionamento (spessore del grasso sulla schiena ≤ 38 mm). Le ovaie sono state esaminate con ecografia nei 20, 30 e 40 giorni post parto ed è stata determinata la concentrazione di progesterone e di 17β-estradiolo nel plasma nei 10, 15, 20, 30 e 40 giorni dopo la filiazione. Sono state accertate 12 cisti ovariche negli animali peripartali con elevato condizionamento e solo 1 in quelli peripartali senza elevato condizionamento ( $P < 0.05$ ). Durante il primo esame sonografico tutte le cisti ovariche sono state definite quali follicoli tecacistici (progesterone nel plasma ≤ 0.5 ng/ml). Gli esami successivi constatarono il persistere di 3 tecacisti, la luteinizzazione di 8 cisti e la cicatrizzazione di 2. Nulla dimostra che, in animali con elevato condizionamento abbiano un alto valore di progesterone e/o di estrogeno nel plasma a causa dell'alta percentuale di grasso prima del sorgere della cisti ovarica.

## Literatur

- Barb C.R., Barrett J.B., Kraeling R.R., Rampacek G.B.: Role of leptin in modulating neuroendocrine function: A metabolic link between the brain-pituitary and adipose tissue. *Reprod. Dom. Anim.* 1999, 34, 112–125.
- Bishop D.K., Wettemann R.P., Spicer L.J.: Body energy reserves influence the onset of luteal activity after early weaning of beef cows. *J. Anim. Sci.* 1994, 72: 2703–2708.
- Bossis I., Wettemann R.P., Welty S.D., Vizcarra J., Spicer L.J.: Nutritionally induced anovulation in beef heifers: Ovarian and endocrine function during realimentation and resumption of ovulation. *Biol. Reprod.* 2000, 62: 1436–1444.
- Farin P.W., Youngquist R.S., Pafet J.R., Garverick H.A.: Diagnosis of luteal and follicular ovarian cysts in dairy cows by sector scan ultrasonography. *Theriogenology* 1990, 34: 633–642.
- Frisch R.E.: Fatness und Fertility. *Sci. Am.* 1988, 258: 88–95.
- Frisch R.E., Snow R.C., Johnson L.A., Gerard B., Barbieri R., Rosen B.: Magnetic resonance imaging of overall and regional body fat, estrogen metabolism, and ovulation of athletes compared to controls. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 1992, 77: 471–477.
- Garverick H.A.: Ovarian follicular cysts in dairy cows. *J. Dairy Sci* 1997, 80: 995–1004.
- Gearhart M.A., Curtis C.R., Erb H.N., Smith R.D., Sniffen C.J., Chase L.E., Cooper M.D.: Relationship of changes in condition score to cow health in holsteins. *J. Dairy Sci.* 1990, 73: 3132–3140.
- Gasse H., Peukert-Adam I., Schwarz R., Grunert E.: Die Stellung der Follikel-Lutein-Zyste im Zyklusgeschehen des Rindes: Histologische, zytologische und hormonanalytische Untersuchungen. *Zbl. Vet. Med. A* 1984, 31: 548–556.
- Grunert E.: Ovarielle Dysfunktionen. In: *Fertilitätsstörungen beim weiblichen Rind*. Hrsg. Grunert E. und Berchtold M., Paul Parey Buchverlag, Berlin, 1999, 111–135.
- Grunert E., Zerbe H.: Diagnose und Therapie der Follikel-Lutein-Zysten des Rindes. *Prakt. Tierarzt, coll. vet.* 1997, XXVII: 92–96.
- Günzler O., Fastner S., Huber E.: Versuche zur Beeinflussung sog. Luteinzysten beim Rind mit dem Prostaglandinanalogue «ESTRUMATE». *Tierärztl. Umschau* 1977, 9: 466–472.
- Imakawa K., Day M.L., Garcia-Winder M., Zalesky D.D., Kittok R.J., Schanbacher B.D., Kinder J.E.: Endocrine changes during restoration of estrous cycles following induction of anestrus by restricted nutrient intake in beef heifers. *J. Anim. Sci.* 1986, 63: 565–571.
- Jeffcoate I.A., Ayliffe T.R.: An ultrasonographic study of bovine cystic ovarian disease and its treatment. *Vet. Rec.* 1995, 136: 406–410.
- Kesler D.J., Garverick H.A., Caudle A.B., Elmore R.G., Youngquist R.S., Bierschwal C.J.: Reproductive hormone and ovarian changes in cows with ovarian cysts. *J. Dairy Sci.* 1980, 63: 166–170.
- Lopez-Gatius F., Santolaria P., Yaniz J., Fenech M., Lopez-Bejar M.: Risk factors for postpartum ovarian cysts and their spontaneous recovery or persistence in lactating dairy cows. *Theriogenology* 2002, 58: 1623–1632.
- Lopez-Gatius F., Lopez-Bejar M.: Reproductive performance of dairy cows with ovarian cysts after different GnRH and cloprostenol treatments. *Theriogenology* 2002, 58: 1337–1348.
- Leidl W., Stolla R., Hundschell C., Bostedt H.: Zur Ovarialzyste des Rindes. I. Klassifizierung und Diagnose. *Berl. Münch. Tierärztl. Wochenschr.* 1979, 92: 369–376.
- Lucy M.C., Savio J.D., Badinga L., De La Sota R.L., Thatcher W.W.: Factors that affect ovarian follicular dynamics in cattle. *J. Anim. Sci.* 1992, 70: 3615–3626.
- Meyer H.H.D., Sauenwein H., Mutayoba B.M.: Immunoaffinity chromatography and a biotin-streptavidin amplified enzymeimmunoassay for sensitive and specific estimation of estradiol-17-b. *J. Steroid. Biochem.* 1990, 35: 263–269.
- Moreira F., Risco C., Pires M.F.A., Ambrose J.D., Drost M., De Lorenzo M., Thatcher W.W.: Effect of body condition on reproductive efficiency of lactating dairy cows receiving a timed insemination. *Theriogenology* 2000, 53: 1305–1319.
- Morrow D.A., Hillman D., Dade A.W., Kitchen Y.: Clinical investigations of dairy herd with fat cow-syndrome. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* 1997, 174: 161–167.
- Mösenfechtel St., Eigenmann U.J., Rüschi P., Wanner M.: Rückenfettdicke und Fruchtbarkeit bei Braunviehkühen. *Schweiz. Arch. Tierheilk.* 2000, 142: 679–689.
- Mujuni P.F., Mgongo F.O.K., Kanuya N.L.: Ovarian cysts, a postpartum ovarian disorder affecting dairy cows in a tropical area. *Anim. Reprod. Sci.* 1993, 31: 175–186.
- Noble K.M., Tebble J.E., Harvey D., Dobson H.: Ultrasonography and hormone profiles of persistent ovarian follicles (cysts) induced with low doses of progesterone in cattle. *J. Reprod. Fert.* 2000, 120: 361–366.
- Peukert-Adam I., Schwarz R., Grunert E.: Zur Follikel-Lutein-Zyste des Rindes. Morphologie und Diskussion ihrer Bedeutung als Sterilitätsfaktor. *Zbl. Vet. Med. A* 1983, 30, 410–428.
- Prakash B.S., Meyer H.H.D., Schallenberger E., van de Wiel D.F.M.: Development of a sensitive enzymeimmunoassay (EIA) for progesterone determination in unextracted bovine plasma using the second antibody technique. *J. Steroid. Biochem.* 1987, 28: 623–627.
- Ribadu A.Y., Ward W.R., Dobson H.: Comparative evaluation of ovarian structures in cattle by palpation per rectum, ultrasonography and plasma progesterone concentration. *Vet. Rec.* 1994, 135: 452–457.
- Richards M.W., Wettemann R.P., Schoenemann H.M.: Nutritional anestrus in beef cows: Body weight change, body condition, luteinizing hormone in serum and ovarian activity. *J. Anim. Sci.* 1989, 67: 1520–1526.

*Schopper D., Claus R.:* Progesteron concentrations in milk-fat around ovulation in the dairy cow: Differences between observed and silent heat. *Zuchthyg.* 1986, 21: 237–240.

*Silvia W.J., Hatler T.B. Nugent A. M. Laranja da Fonseca L. F.:* Ovarian follicular cysts in dairy cows: An abnormality in folliculogenesis. *Dom. Anim. Endocrinol.* 2002, 23: 167–177.

*Staufenbiel R.:* Konditionsbeurteilung von Milchkühen mit Hilfe der sonographischen Rückenfettdickenmessung. *Prakt. Tierarzt, coll. vet.*, 1997, XXVII: 87–92.

*Studer E.:* A veterinary perspective of on-farm evaluation of nutrition and reproduction. *J. Dairy Sci.* 1998, 81: 872–876.

*Weber E.:* Grundriss der biologischen Statistik. 10. Aufl., G. Fischer Verlag Stuttgart, 1995.

*Wiltbank M.C., Gümen A., Sartori R.:* Physiological classification of anovulatory conditions in cattle. *Theriogenology* 2002, 57:21–52.

---

### Korrespondenzadresse

Martin Hasler, Blumenweg 11, CH-9113 Degersheim; Fax: 0041 71 371 22 75;  
E-mail: martin\_hasler@bluewin.ch

*Manuskripteingang: 20. Oktober 2003*

*In vorliegender Form angenommen: 5. Dezember 2003*