

Antibiotikaresistenz von *Staphylococcus aureus* und Koagulase-negativen Staphylokokken isoliert aus Mastitismilchproben von Schafen und Ziegen

F. Kunz¹, S. Corti¹, N. Giezendanner¹, R. Stephan¹, M.M. Wittenbrink², C. Zweifel¹

¹Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene und ²Institut für Veterinärbakteriologie der Universität Zürich

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden aus Mastitismilchproben von Schafen und Ziegen von über 40 Betrieben der Schweiz *Staphylococcus aureus* und Koagulase-negative Staphylokokken (CNS) isoliert. Bei den CNS konnte mittels Restriktionsprofil-Analyse des *groEL*-Gens und 16S rDNA Sequenzierung gezeigt werden, dass verschiedene Spezies vorkamen, wenn auch einzelne dominierten. Die Resistenzprüfung der Mastitiserreger gegen ausgewählte Antibiotika erfolgte mittels des Mikrodilutionsverfahrens. Von den 67 *S. aureus*- und 208 CNS-Stämmen waren 31.3% und 8.2% resistent gegen Penicillin, 29.9% und 1.0% resistent gegen Ampicillin, 1.5% und 10.6% resistent gegen Erythromycin sowie 3.0% und 7.7% resistent gegen Tetracyclin. Zudem waren 10 CNS-Stämme (4.8%) resistent gegen Oxacillin und ein CNS-Stamm gegen Sulfamethoxazol/Trimethoprim. Die vorliegenden Daten stellen eine erste Bestandaufnahme zur Resistenzsituation bei Mastitisern von Schafen und Ziegen in der Schweiz dar. Zur Mastitisbekämpfung sind aber bei Kleinwiederkäuern auch flankierende und präventive Massnahmen von entscheidender Bedeutung.

Schlüsselwörter: Mastitiserreger, Kleinwiederkäuer, Antibiotikaresistenz, Minimale Hemmkonzentration (MHK)

Antimicrobial resistance of *Staphylococcus aureus* and coagulase negative staphylococci isolated from mastitis milk samples from sheep and goats.

Staphylococcus aureus and coagulase negative staphylococci (CNS) were isolated from ovine and caprine mastitis milk samples originating from more than 40 Swiss farms. CNS dominated as causal microorganisms of mastitis in small ruminants. By restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis of the *groEL* gene and sequencing of 16S rDNA, various CNS species were identified, albeit certain of them predominated. For susceptibility testing of mastitis pathogens to selected antibiotics, minimal inhibitory concentrations were determined. Of the 67 *S. aureus* and 208 CNS strains, 31.3% and 8.2% were resistant to penicillin, 29.9% and 1.0% to ampicillin, 1.5% and 10.6% to erythromycin, and 3.0% and 7.7% to tetracycline, respectively. Moreover, 10 CNS strains (4.8%) were resistant to oxacillin and one CNS strain to sulfamethoxazole/trimethoprim. The results obtained describe for the first time the resistance situation of mastitis pathogens from sheep and goats in Switzerland. However, accompanying and preventing measures are also of importance in mastitis control of small ruminants.

Keywords: Mastitis pathogens, small ruminants, antimicrobial resistance, minimal inhibitory concentration (MIC)

Einleitung

In der Schweiz werden aktuell mehr als 36'000 Milchziegen unterschiedlicher Rassen und mehr als 10'500 Milchschafe, überwiegend der Rassen Ostfriesisches Milchschaaf und Lacaune, gehalten (Schweizerischer Bauernverband, www.sbv-usp.ch). Aufgrund des Trends der Konsum-

menten zu möglichst naturbelassenen Produkten besteht eine steigende Nachfrage nach Schaf- und Ziegenmilch sowie daraus hergestellter Rohmilchkäse und Milchspezialitäten.

Mastitiden bakterieller Ätiologie gehören zu den häufigsten Gesundheitsproblemen von Milchkühen, -schafen und -ziegen. In der Schweiz sind im Durchschnitt zwischen

64 Originalarbeit

20 und 40 % der Euterhälften von Milchschaafen und -ziegen von einer Mastitis betroffen (Schaeren und Maurer, 2006; Maurer und Schaeren, 2007). Akute und chronische Mastitiden stellen für Milchproduzenten ein grosses wirtschaftliches Problem dar, da sie durch Reduktion der Milchleistung, Beeinträchtigung der Milchqualität (veränderte Zusammensetzung), Preisabzüge, zusätzlichem Arbeitsaufwand und den Behandlungskosten zu erheblichen Verlusten oder gar zum Ausmerzen von Tieren führen (Gonzalo et al., 2002; Halasa et al., 2007). Aus milchhygienischer Sicht sowie im Rahmen des Veterinary Public Health (VPH) Ansatzes sind dabei insbesondere subklinische Mastitiden von Bedeutung. Bei Kleinwiederkäuern nehmen *S. aureus* bei klinischen Mastitiden und Koagulase-negative Staphylokokken (CNS) bei subklinischen Mastitiden eine dominierende Stellung ein.

In der Schweiz gibt es zurzeit mit Ausnahme des Trockenstellers Nafpenzal® DC (Veterinaria, Pfäffikon, CH) keine zur intramammären Anwendung bei Schafen und Ziegen zugelassene Antibiotika. Die Tierarzneimittelverordnung (TAMV, SR 812.212.27) erlaubt jedoch die Umwidmung von zur Mastitistherapie bei Kühen zugelassenen Antibiotika. Insbesondere bei Kleinwiederkäuern muss die Mastitisbekämpfung jedoch neben dem Antibiotikaeinsatz auch flankierende und präventive Massnahmen zur Ausschaltung prädisponierender Faktoren wie ungünstiger Aufstallungssysteme, fehlerhafter Betriebs- und Melkhygiene oder Fehler im Zusammenhang mit der Melkmaschine beinhalten (Bergonier et al., 2003; Zweifel et al., 2005; Contreras et al., 2007). Daten zur Resistenzsituation von Mastitiserregern von Schafen und Ziegen fehlten bis anhin in der Schweiz. Ziel der vorliegenden Arbeit war es (a) Mastitiserreger (*S. aureus*, CNS) aus Mastitismilchproben von Schafen und Ziegen zu isolieren, (b) CNS weitergehend zu charakterisieren respektive zu identifizieren und (c) Daten zur Antibiotika-Resistenzsituation der isolierten Mastitiserreger zu erheben.

Material und Methoden

Mastitismilchproben

Im Verlauf eines Jahres wurden Milchproben von Schafen und Ziegen mit klinischer oder subklinischer Mastitis gesammelt und am Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene der Universität Zürich auf Mastitiserreger untersucht. Die 275 Milchproben, in welchen *S. aureus* oder CNS nachgewiesen wurden, stammten von mehr als 40 Betrieben aus verschiedenen Regionen der Schweiz.

Stammisolation, -identifizierung und -charakterisierung

Zur Untersuchung auf Mastitiserreger wurden die Milchproben auf Blutagarplatten (Difco Laboratories, Detroit,

USA; 5% Schafblut defibriniert, Oxoid Ltd., Hampshire, UK) und auf Bromthymolblau Laktose Agarplatten (BROLAC-Agar, bioMérieux SA, Marcy-l'Etoile, F) ausgestrichen und bei 37 °C während 24 h inkubiert. Von jeder Probe mit Gram-positiven, Katalase-positiven Kokken wurde eine Kolonie-bildende Einheit mittels DNase Test Agarplatten (Becton Dickinson AG, Allschwil, CH) auf ihre DNase-Bildung überprüft (Fantelli und Stephan, 2003). Als Kontrollstamm diente *S. aureus* ATCC 25923. Zudem wurde auf Baird Parker plus Rabbit Plasma Fibrinogen Agar (Oxoid Ltd.) die Koagulase-reaktion überprüft. DNase-positive (Aufhellungszone auf DNase Test Agar), Koagulase-positive Kolonien mit Doppelhämolyse (β/δ) auf Blutagar wurden als *S. aureus* und Koagulase-negative Kolonien als CNS klassifiziert. Die weiterführende Charakterisierung von CNS erfolgte mittels Restriktionsprofil-Analyse (PCR-RFLP) des *groEL*-Gens (Santos et al., 2008). Aufgrund der Restriktionsprofile wurden die CNS-Stämme verschiedenen Clustern zugeordnet. Zur Speziesidentifizierung wurde von einem oder zwei Stämmen ausgewählter PCR-RFLP-Cluster (≥ 2 Isolate) eine 16S rDNA Sequenzierung durchgeführt (Juretschko et al., 2002).

Prüfung der Antibiotikaresistenz

Die Prüfung der Antibiotikaresistenz erfolgte unter Verwendung des Mikrodilutionsverfahrens (Sensititre NLV 72, Trek Diagnostik Systems Ltd., West Sussex, UK). Isolierte *S. aureus*- und CNS-Stämme wurden auf die Empfindlichkeit gegenüber Amoxicillin/Clavulansäure, Ampicillin, Cefazolin, Cephalotin, Enrofloxacin, Erythromycin, Gentamicin, Oxacillin, Penicillin G, Sulfamethoxazol/Trimethoprim und Tetracyclin getestet. Die getesteten Konzentrationsbereiche sowie die zur Beurteilung der MHK-Werte (MHK = Minimale Hemmkonzentration) verwendeten Breakpoints sind in den Tabellen 2 und 3 aufgeführt.

Ergebnisse und Diskussion

Mastitisstämme

Im Stammkollektiv der 275 Mastitiseisolate von Kleinwiederkäuern wurden 67 Stämme als *S. aureus* und 208 als CNS identifiziert. Diese Stämme wurden jeweils zu etwa gleichen Teilen aus Milchproben von Schafen und Ziegen isoliert. Dabei stammten die 67 *S. aureus*-Stämme (36 von Schafen, 31 von Ziegen) aus 25 Betrieben sowie 203 der CNS-Stämme (105 von Schafen, 98 von Ziegen) aus 31 Betrieben.

Charakterisierung und Identifizierung Koagulase-negativer Staphylokokken (CNS)

CNS sind bei Schafen und Ziegen eine sehr häufige Ursache von Mastitiden, insbesondere von subklinischen (Mc-

Dougall et al., 2002; Moroni et al., 2005a; Contreras et al., 2007). Für die Beurteilung der potentiellen Pathogenität bestimmter Spezies werden dabei Daten zur Charakterisierung und Speziesidentifizierung immer wichtiger (Pyörälä und Taponen, 2009; Zadoks und Watts, 2009).

Die Restriktionsprofil-Analyse einer Auswahl von 155 CNS-Stämmen ordnete diese 18 verschiedenen Gruppen (Clustern) mit unterschiedlichen Restriktionsmustern zu. Die Anzahl der Isolate pro Cluster reichte von einem bis zu 64 Stämmen. Dabei umfassten drei Cluster zwei Drittel der 155 typisierten Stämme (66.5%). Zur Speziesidentifizierung wurde von jeweils einem oder zwei Stämmen aus 12 verschiedenen Clustern mit insgesamt 144 Isolaten eine 16S rDNA Sequenzierung durchgeführt. Tabelle 1 zeigt die dabei erhaltene Zuordnung der Restriktionsprofile zu 10 verschiedenen CNS-Spezies. In den drei dominierenden Clustern wurden *S. saprophyticus*, *S. equorum* und *S. lentus* nachgewiesen. Daher scheinen bei den CNS aus Mastitismilchproben von Schafen und Ziegen in der Schweiz bestimmte Spezies zu dominieren, wenn auch viele verschiedene als Mastitiserreger bei Kleinwiederkäuern verbreitet sind.

In anderen Studien (Rodrigues da Silva et al., 2004; Contreras et al., 2007; Marogna et al., 2010) wurde ebenfalls eine Vielzahl von CNS-Spezies aus Milchproben von Schafen und Ziegen isoliert. Trotz geographischer Unterschiede und Unterschieden zwischen den Tierarten dominierten dabei oft *S. epidermidis*, *S. caprae*, *S. simulans*, *S. chromogenes* und *S. xylosus*. Überdies scheint ein Zusammenhang sowohl zwischen der Zellzahl und der CNS-Spezies wie auch zwischen dem Vorkommen von Antibiotikaresistenzen und der CNS-Spezies zu bestehen (Rodrigues da Silva et al. 2004; Schaeren und Halde- mann, 2009).

Antibiotikaresistenz

Die Ergebnisse der Empfindlichkeitsprüfung von *S. aureus* und CNS aus Mastitismilchproben von Kleinwiederkäuern sind in den Tabellen 2 und 3 aufgeführt. Bislang lagen nur wenige aktuelle Daten zur Resistenzsituation von Mastitiserregern bei Schafen und Ziegen vor und für die Schweiz fehlten solche bis anhin ganz. Zudem wird ein Vergleich der Ergebnisse durch variierende Rahmenbedingungen wie der Auswahl der Mikroorganismen und Antibiotika oder den Verfahren und Kriterien zur Resistenzbeurteilung erschwert (Schwarz et al., 2010).

Bei den 67 aus Mastitismilchproben von Kleinwiederkäuern isolierten *S. aureus*-Stämmen wurden Resistenzen gegen Ampicillin, Erythromycin, Penicillin G und Tetracyclin gefunden (Tab. 2). Knapp ein Drittel der *S. aureus*-Stämme wies jeweils eine Penicillinresistenz (31.3%) und eine Ampicillinresistenz (29.9%) auf. Diese lagen in der Regel in Kombination vor. Zudem war jeweils ein Stamm resistent gegen die Kombination von Penicillin G und Erythromycin oder Penicillin G und Tetracyclin. Mit Ausnahme der Penicillin- und Ampicillinresistenzen verfügten die 67 isolierten *S. aureus*-Stämme jedoch nur selten über Resistenzen gegen die getesteten Antibiotika. In einer brasilianischen Studie (Rodrigues da Silva et al., 2004) erwiesen sich ebenfalls etwa ein Drittel der aus Ziegenmilchproben isolierten *S. aureus*-Stämme (36%) als Penicillin-resistent, während in Studien aus Italien (Moroni et al., 2005b; Lollai et al. 2008), Norwegen (Mørk et al., 2005) oder Slowenien (Pengov und Ceru, 2003) nur vereinzelte *S. aureus*-Stämme aus Schaf- oder Ziegenmilch eine solche Resistenz aufwiesen.

Bei den 208 aus Mastitismilchproben von Kleinwiederkäuern isolierten CNS-Stämmen wurden Resistenzen

Tabelle 1: Charakterisierung von 144 aus Schaf- und Ziegenmilch isolierten Koagulase-negativen Staphylokokken-Stämmen.

Anzahl CNS-Stämme (Schaf-/Ziegenmilch)	PCR-RFLP- Profil ^{a)}	Speziesidentifikation (16S rDNA)
64 (36/28)	A	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>
27 (9/18)	B	<i>Staphylococcus equorum</i>
12 (9/3)	C	<i>Staphylococcus lentus</i>
9 (5/4)	D	<i>Staphylococcus epidermidis</i>
7 (4/3)	E	<i>Staphylococcus chromogenes</i>
6 (4/2)	F	<i>Staphylococcus capitis</i>
6 (2/4)	G	<i>Staphylococcus succinus</i>
4 (3/1)	H	<i>Staphylococcus xylosus</i>
3 (2/1)	I	<i>Staphylococcus haemolyticus</i>
2 (2/0)	J	<i>Staphylococcus simulans</i>
2 (1/1)	K	<i>Staphylococcus succinus</i>
2 (1/1)	L	<i>Staphylococcus epidermidis</i>

^{a)}Restriktionsprofil-Analyse (PCR-RFLP) des *groEL*-Gens (Santos et al., 2008).

66 Originalarbeit

Tabelle 2: Minimale Hemmkonzentrationen (MHK) bei den 67 aus Mastitismilchproben von Schafen und Ziegen isolierten *Staphylococcus aureus*-Stämmen.

Wirkstoff	Anzahl Stämme mit MHK ($\mu\text{g/ml}$) von										Anteil resistenter Stämme
	< 0.125	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	32	
Amoxicillin/Clavulansäure ^(a)			58	5		2	2				0%
Ampicillin	41	5	1	14	6						29.9%
Cefazolin							67				0%
Cephalotin					67						0%
Enrofloxacin	47	18	1	1							0%
Erythromycin	2	20	42	2				1			1.5%
Gentamicin				67							0%
Oxacillin		63	4								0%
Penicillin G	45	1	5	7	5	1	3				31.3%
Sulfamethoxazol/Trimethoprim ^(a)			67								0%
Tetracyclin				61	1	1		2	2		3.0%

Die für jedes Antibiotikum getesteten Konzentrationsbereiche sind weiss hinterlegt (Sensititre custom plate). Werte über oder unter diesen Bereichen stehen für MHK-Werte grösser als die höchste getestete Konzentration bzw. kleiner oder gleich als die geringste getestete Konzentration. Die vertikalen schwarzen Balken zeigen die jeweiligen, im CLSI Supplement M100-S18 für *S. aureus* aufgeführten Breakpoints (Clinical and Laboratory Standards Institute, 2008).

^(a)Konzentrationen für Amoxicillin (Verhältnis Amoxicillin/Clavulansäure 2:1) und Trimethoprim (Verhältnis Sulfamethoxazol/Trimethoprim 19:1)

Tabelle 3: Minimale Hemmkonzentrationen (MHK) bei den 208 aus Mastitismilchproben von Schafen und Ziegen isolierten Koagulase-negativen Staphylokokken-Stämmen.

Wirkstoff	Anzahl Stämme mit MHK ($\mu\text{g/ml}$) von										Anteil resistenter Stämme
	< 0.125	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	32	
Amoxicillin/Clavulansäure ^(a)			205	3							0%
Ampicillin	182	20	4		1	1					1.0%
Cefazolin							208				0%
Cephalotin					207			1			0%
Enrofloxacin	87	100	15	3	2	1					0%
Erythromycin	20	61	74	9	4	12	6	22			10.6%
Gentamicin				207		1					0%
Oxacillin		125	73	8	1	1					4.8%
Penicillin G	191		8	4	2		1	1	1		8.2%
Sulfamethoxazol/Trimethoprim ^(a)			205	2			1				0.05%
Tetracyclin				188	3		1		16		7.7%

Die für jedes Antibiotikum getesteten Konzentrationsbereiche sind weiss hinterlegt (Sensititre custom plate). Werte über oder unter diesen Bereichen stehen für MHK-Werte grösser als höchste getestete Konzentration bzw. kleiner oder gleich als die geringste getestete Konzentration. Die vertikalen schwarzen Linien zeigen die jeweiligen, im CLSI Supplement M100-S20 für Koagulase-negative Staphylokokken aufgeführten Breakpoints (Clinical and Laboratory Standards Institute, 2010).

^(a)Konzentrationen für Amoxicillin (Verhältnis Amoxicillin/Clavulansäure 2:1) und Trimethoprim (Verhältnis Sulfamethoxazol/Trimethoprim 19:1)

gegen Ampicillin, Erythromycin, Oxacillin, Penicillin G, Sulfamethoxazol/Trimethoprim und Tetracyclin gefunden (Tab. 3). Dabei dominierten Resistenzen gegen Erythromycin (10.6 %) und Penicillin (8.2 %). CNS waren im Vergleich zu den untersuchten *S. aureus*-Stämmen signifikant weniger häufig resistent gegen Penicillin und Ampicillin sowie signifikant häufiger resistent gegen Erythromycin ($P < 0.001$; Chi-Quadrat Test). Auch erwiesen sich 4.8 % der isolierten CNS-Stämme als resistent gegen Oxacillin, während eine solche Resistenz bei den untersuchten *S. aureus*-Stämmen nicht gefunden wurde. In anderen Studien (Rodrigues da Silva et al., 2004; Lollai et al., 2008) wurden bei aus Milchproben von Schafen und Ziegen isolierten CNS-Stämmen oft höhere Resistenzraten gegen Penicillin, insbesondere höhere als bei *S. aureus*, gefunden. Auch erwiesen sich in der Studie von Rodrigues da Silva et al. (2004) 22.5 % der aus Ziegenmilch isolierten CNS als Oxacillin-resistent. Zudem zeigten diese Autoren, dass zwischen verschiedenen CNS-Spezies Unterschiede in den Resistenzprofilen und -raten vorlagen (Rodrigues da Silva et al., 2004).

Für die Schweiz lagen bis anhin lediglich Resistenzdaten zu bovinen Mastitiserregern vor. Bei bovinen *S. aureus* wurden dabei insbesondere Penicillin- und Ampicillinresistenzen gefunden, wobei die Häufigkeit in der Regel bei ≤ 15 % lag (Busato et al., 2000; Corti et al., 2003; Roesch et al., 2006). Im Gegensatz zu den vorliegenden Ergebnissen von Kleinwiederkäuern wurden bei bovinen CNS oft höhere Resistenzraten gegen Penicillin (> 30 %) sowie Ampicillin nachgewiesen (Corti et al., 2003; Roesch et al. 2006). So wiesen in der Studie von Corti et

al. (2003) von den bovinen *S. aureus*-Stämmen 9 % eine Penicillin- und 7 % eine Ampicillinresistenz auf, während 31 % der CNS gegen Penicillin und 26 % gegen Ampicillin resistent waren.

Schlussfolgerungen

Koagulase-negative Staphylokokken (CNS) dominieren als Erreger von Mastitiden bei Schafen und Ziegen in der Schweiz. Bei gehäuftem Auftreten von Mastitiden sollte auch bei Kleinwiederkäuern eine bakteriologische Abklärung der Ursache durchgeführt werden, denn insbesondere bei Ziegenmilch sind Zellzahlen zur Erkennung von Mastitiden nur beschränkt tauglich (Schaeren et al., 2007). Insgesamt dominierten bestimmte CNS-Spezies, wenn auch viele verschiedene CNS als Mastitiserreger bei Kleinwiederkäuern nachgewiesen wurden. Dabei könnten sich verschiedene CNS-Spezies in ihrer Pathogenität und auch hinsichtlich des Vorkommens von Antibiotikaresistenzen unterscheiden. Insbesondere in Betrieben mit Bestandesproblemen kann es daher angezeigt sein, Infektionen mit CNS genauer zu untersuchen. Die festgestellten Unterschiede in der Empfindlichkeit der Mastitiserreger gegenüber den getesteten Antibiotika unterstreichen die Bedeutung der Resistenzprüfung, zusammen mit einer zuverlässigen Identifizierung der Erreger. Allerdings sind die Aussagen unter Praxisbedingungen zu relativieren, da die Prüfung *in vitro* erfolgte. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stellen eine erste Bestandaufnahme zur Resistenzsituation bei *S. aureus* und CNS von Schafen und Ziegen in der Schweiz dar.

Résistance aux antibiotiques de *Staphylococcus aureus* et de Staphylocoques coagulase négatifs isolés dans des échantillons de lait mammiteux de chèvre et de mouton

Dans le cadre de ce travail, on a isolé des *Staphylococcus aureus* et des Staphylocoques coagulase négatifs (CNS) dans le lait mammiteux de chèvres et de moutons provenant de 40 exploitations suisses. Chez les CNS, on a pu montrer, au moyen d'une analyse du profil de restriction du gène *groEL* et du séquençage 16s rDNA, qu'il existait plusieurs espèces même si certaines prédominaient. L'analyse de la résistance de ces agents face à des antibiotiques choisis a été effectuée avec un principe de micro-dilution. Des 67 souches de *S. aureus* et des 208 souches CNS 31 %, respectivement 8.2 % étaient résistants à la pénicilline, resp. 1 % à l'ampicilline, 1.5 % resp. 10 % résistants à l'érythromycine, 3 % resp. 7.7 % résistants à la tétracycline. En outre, 10 souches CNS (4.8 %) étaient résistantes à

Resistenza agli antibiotici dello *Staphylococcus aureus* e degli stafilococchi coagulasi negativi, isolati in un campione di latte di pecore e capre affette da mastite

Nel quadro di questo studio sono stati isolati gli *Staphylococcus aureus* e gli stafilococchi coagulasi negativi (SCN) provenienti da campioni di latte infetti da mastite provenienti da pecore e capre di più di 40 aziende svizzere. Nel caso del SCN, si è potuto mostrare via analisi del tipo restrittivo del gene *groEL* e della sequenza del 16S rDNA, che ricorrevano in varie specie anche se dominavano alcune singole. L'esame alla resistenza dell'agente patogeno della mastite verso antibiotici scelti succedeva via la procedura della microdiluzione. Dai ceppi di 67 *S. aureus* e di 208 SCN si è riscontrato che il 31.3 % risp. l'8.2 % erano resistenti alla penicillina, il 29.9 % risp. l'1.0 % erano resistenti all'ampicillina, l'1.5 % risp. il 10.6 % erano resistenti alla eritromicina e il 3.0 % risp. il 7.7 % erano resi-

68 Originalarbeit

l'oxacilline et une souche CNS résistante au triméthoprime-sulfaméthoxazole. Ces données constituent un premier point de situation quant à la résistance des agents responsables de mammites chez les chèvres et moutons en Suisse. Toutefois, particulièrement chez les petits ruminants des mesures d'accompagnement et de préventions sont décisives pour la lutte contre les mammites.

stente alla tetraciclina. Inoltre 10 ceppi SCN (4.8%) erano resistenti alla oxacillina e un ceppo di SCN era resistente al sulfametoxazolo/trimetopim. Questi dati rispecchiano una prima constatazione riguardo alla situazione della resistenza degli agenti patogeni della mastite nelle pecore e capre in Svizzera. Per combattere la mastite, in particolare nei piccoli ruminanti, l'adozione di misure di accompagnamento e preventive sono di importanza fondamentale.

Literatur

- Bergonier D., de Crémoux R., Rupp R., Lagriffoul G., Berthelot X.: Mastitis of dairy small ruminants. *Vet. Res.* 2003, 34: 689–716.
- Busato A., Trachsel P., Schällibaum M., Blum J.W.: Udder health and risk factors for subclinical mastitis in organic dairy farms in Switzerland. *Prev. Vet. Med.* 2000, 44: 205–220.
- Clinical and Laboratory Standards Institute, 2008: Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; sixteenth informational supplement M100-S18, vol. 28. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
- Clinical Laboratory Standards Institute, 2010: Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twentieth informational supplement M100-S20, Vol. 30. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
- Contreras A., Sierra D., Sánchez A., Corrales J.C., Marco J.C., Paape M.J., Gonzalo C.: Mastitis in small ruminants. *Small Rumin. Res.* 2007, 68: 145–153.
- Corti S., Sicher D., Regli W., Stephan R.: Aktuelle Daten zur Antibiotikaresistenz der wichtigsten bovinen Mastitisserreger in der Schweiz. *Schweiz. Arch. Tierheilk.* 2003, 145: 571–575.
- Fantelli K., Stephan R.: Validierung der DNase-Reaktion zur Identifizierung von *Staphylococcus aureus* Stämmen im Rahmen der Mastitisdiagnostik. *Schweiz Arch. Tierheilk.* 2003, 145: 76–79.
- Gonzalo C., Ariznabarreta A., Carriedo J.A., San Primitivo F.: Mammary pathogens and their relationship to somatic cell count and milk yield losses in dairy ewes. *J. Dairy Sci.* 2002, 85: 1460–1467.
- Halasa T., Huijps K., Østerås O., Hogeveen H.: Economic effects of bovine mastitis and mastitis management: A review. *Vet. Q.* 2007, 29: 18–31.
- Juretschko S., Loy A., Lehner A., Wagner M.: The microbial community composition of a nitrifying-denitrifying activated sludge from an industrial sewage treatment plant analyzed by the full-cycle rRNA approach. *Syst. Appl. Microbiol.* 2002, 25: 84–99.
- Lollai S.A., Ziccheddu M., Di Mauro C., Manunta D., Nudda A., Leori G.: Profile and evolution of antimicrobial resistance of ovine mastitis pathogens (1995–2004). *Small Rumin. Res.* 2008, 74: 249–254.
- Marogna G., Rolesu S., Lollai S., Tola S., Leori G.: Clinical findings in sheep farms affected by recurrent bacterial mastitis. *Small Rumin. Res.* 2010, 88: 119–125.
- Maurer J., Schaeren W.: Eutergesundheit und Zellzahlen bei Milchschaafen. *Agrarforschung* 2007, 14: 162–167.
- McDougall S., Pankey W., Delaney C., Barlow J., Murdough P.A., Scruton D.: Prevalence and incidence of subclinical mastitis in goats and dairy ewes in Vermont, USA. *Small Rumin. Res.* 2002, 46: 115–121.
- Mørk T., Tollersrud T., Kvitle B., Jørgensen H.J., Waage S.: Comparison of *Staphylococcus aureus* genotypes recovered from cases of bovine, ovine, and caprine mastitis. *J. Clin. Microbiol.* 2005, 43: 3979–3984.
- Moroni P., Pisoni G., Antonini M., Ruffo G., Carli S., Varisco G., Boettcher P.: Subclinical mastitis and antimicrobial susceptibility of *Staphylococcus caprae* and *Staphylococcus epidermidis* isolated from two Italian goat herds. *J. Dairy Sci.* 2005a, 88: 1694–1704.
- Moroni P., Pisoni G., Vimercati C., Rinaldi M., Castiglioni B., Cremonesi P., Boettcher P.: Characterization of *Staphylococcus aureus* isolated from chronically infected dairy goats. *J. Dairy Sci.* 2005b, 88: 3500–3509.
- Pengov A., Ceru S.: Antimicrobial drug susceptibility of *Staphylococcus aureus* strains isolated from bovine and ovine mammary glands. *J. Dairy Sci.* 2003, 86: 3157–3163.
- Pyörälä S., Taponen S.: Coagulase-negative staphylococci – Emerging mastitis pathogens. *Vet. Microbiol.* 2009, 134: 3–8.
- Rodrigues da Silva E., Pimenta Siqueira A., Dias Martins J.C., Barbosa Ferreira W.P., da Silva N.: Identification and *in vitro* antimicrobial susceptibility of *Staphylococcus* species isolated from goat mastitis in the Northeast of Brazil. *Small Rumin. Res.* 2004, 55: 45–49.
- Roesch M., Perreten V., Doherr M.G., Schaeren W., Schällibaum M., Blum J.W.: Comparison of antibiotic resistance of udder pathogens in dairy cows kept on organic and on conventional farms. *J. Dairy Sci.* 2006, 89: 989–997.
- Santos O.C., Barros E.M., Brito M.A., Bastos Mdo C., Dos Santos K.R., Giambiagi-Demarval M.: Identification of coagulase-negative staphylococci from bovine mastitis using RFLP-PCR of the *groEL* gene. *Vet. Microbiol.* 2008, 130: 134–140.

Schaeren W, Maurer J.: Häufigkeiten subklinischer Euterinfektionen und individuelle Zellzahlen in drei Ziegenherden im Verlaufe einer gesamten Laktation. Schweiz. Arch. Tierheilk. 2006, 148: 641–648.

Schaeren W, Jakob E, Maurer J, Ryffel S.: Ziegen- und Schafmilchproduktion – Qualität zahlt sich aus: Merkblatt für die Praxis. ALP aktuell 2007, 29: 1–4.

Schaeren W, Haldemann C.: Vorkommen verschiedener Arten von Staphylokokken als Euterinfektionserreger bei Ziegen. Forum Kleinwiederkäuer 2009, 12: 14–17.

Schwarz S, Silley P, Simjee S, Woodford N, van Duijkeren E, Johnson A.P, Gaastra W.: Assessing the antimicrobial susceptibility of bacteria obtained from animals. Vet. Microbiol. 2010, 141: 1–4.

Zadoks R.N., Watts J.L.: Species identification of coagulase-negative staphylococci: Genotyping is superior to phenotyping. Vet. Microbiol. 2009, 134: 20–28.

Zweifel C., Muehlherr J.E., Ring M., Stephan R.: Influence of different factors in milk production on standard plate count of raw small ruminant's bulk-tank milk in Switzerland. Small Rumin. Res. 2005, 58: 63–70.

Korrespondenz

Claudio Zweifel
Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene
Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich
Winterthurerstrasse 272
CH-8057 Zürich
E-Mail: ils@fsafety.uzh.ch
Tel.: + 41 (0)44 635 86 51
Fax: + 41 (0)44 635 89 08

Manuskripteingang: 2. März 2010

Angenommen: 6. Juni 2010